



# วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies vaccine)

## โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร

- เกิดจากเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า คนได้รับเชื้อเมื่อถูกกัดโดยสัตว์ที่เป็นโรคนี

## โรคพิษสุนัขบ้ามีอาการอย่างไร

- ผู้ป่วยมักไม่มีอาการในช่วงแรก ต่อมาประมาณ 2-3 เดือน เริ่มมีไข้ ปวดศีรษะ เจ็บหรือคันบริเวณที่เคยถูกกัด หงุดหงิดสับสน กระวนกระวาย อาจมีอาการอ่อนแรง กลั้วน้ำ และอาจมีอาการชัก และเสียชีวิตทุกราย



## คุณสมบัติวัคซีน



ผลิตจากเชื้อพิษสุนัขบ้าที่ตายแล้ว และไม่ก่อให้เกิดโรค

## บุคคลที่ไม่ควรได้รับวัคซีน

- มีอาการแพ้อย่างรุนแรงต่อวัคซีนพิษสุนัขบ้าเข็มก่อน ควรเปลี่ยนชนิดวัคซีนในเข็มถัดไป

## อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังรับวัคซีน

- ปวด บวม แดง คันในบริเวณที่ฉีดวัคซีน
- มีไข้ ปวดในข้อ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียนได้ อาการมักไม่รุนแรง และหายได้เอง
- อาการแพ้รุนแรง ได้แก่ มีผื่นทั้งตัว หน้าบวม คอบวม หายใจลำบาก ใจสั่น วิงเวียนหรืออ่อนแรง

## ข้อควรปฏิบัติ

- หากถูกสัตว์กัด รับล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่ นาน 15 นาที และพบแพทย์โดยเร็วที่สุด
- กรณีถูกสัตว์กัดหรือสัมผัสกับเชื้อพิษสุนัขบ้า ต้องฉีดวัคซีนทันทีโดยไม่มีข้อห้าม เพราะโรคพิษสุนัขบ้ามีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 100
- พักสังเกตอาการ 30 นาทีหลังฉีด ณ สถานที่รับบริการและควรสังเกตอาการต่อที่บ้าน หากมีอาการข้างเคียงควรปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนการรับวัคซีนครั้งต่อไป
- หากรับวัคซีนแล้วมีอาการแพ้รุนแรงควรรีบพบแพทย์ หรือโทร 1669
- ควรสังเกตอาการสัตว์ที่กัดเป็นเวลา 10 วัน หากเสียชีวิตควรส่งสัตว์ที่ตายแล้วตรวจโรคพิษสุนัขบ้าที่สถานเสาวภาหรือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- ควรเคร่งครัดในการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด เพราะเป็นโรครุนแรงที่ทำให้เสียชีวิตได้ หากไม่ได้มาตามกำหนดให้รีบมารับวัคซีนต่อเร็วที่สุด

## ฉีดวัคซีนอย่างไร

### การให้เพื่อป้องกันโรคก่อนถูกสัตว์กัด

- พิจารณาให้แก่ผู้ที่ต้องอยู่ใกล้ชิดสัตว์ เช่น สัตวแพทย์ สัตวบาล เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการพิษสุนัขบ้า นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแหล่งของโรค และอาจพิจารณาฉีดในเด็กที่มีโอกาสสัมผัส แมว สุนัข บ่อยๆ โดยฉีด 2 เข็ม ที่วันที่ 0 และ 7 หลังเข็มแรก

### การให้วัคซีนหลังถูกสัตว์กัด

- หากไม่เคยรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อน ควรได้วัคซีนจำนวน 5 เข็ม โดยฉีดเข็มแรกให้เร็วที่สุด และเข็มต่อมาในวันที่ 3, 7, 14 และ 28 หลังเข็มแรก แพทย์อาจพิจารณาให้ยาอิมมูโกลโกลบินเพื่อช่วยเสริมการป้องกันโรคด้วย ถ้าเป็นแผลกัดที่มีความเสี่ยงสูง
- หากเคยรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้วนานเกิน 6 เดือน ต่อมาถูกสัตว์กัด ควรได้รับวัคซีนกระตุ้น 2 เข็มห่างกัน 3 วัน หากเคยฉีดมาก่อนไม่เกิน 6 เดือนให้กระตุ้น 1 เข็ม

## วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าวัคซีน

- การให้เพื่อป้องกันโรคก่อนการสัมผัส ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง แต่ผู้รับวัคซีนหลังถูกสัตว์กัดสามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพได้

